



AZ Voorkepen

algemeen ziekenhuis
emmaüs



Inhoudsverantwoordelijke: Griet Helsen - Kinderafdeling • V.U: Koen Vancraeynest - algemeen directeur • Versiedatum: 22 juli 2020

**Lymfeklier-
ontsteking**
Mesenteriële adenitis

Wat is mesenterische adenitis?

Mesenterische adenitis verwijst naar een aandoening waarbij de lymfeklieren (belangrijk onderdeel van het immuunsysteem), gelegen in het spijsverteringsstelsel, ontstoken zijn wat tot zwelling van de klieren leidt. Het komt meestal voor bij kinderen jonger dan zestien jaar.

Oorzaken

In de meeste gevallen is het een gevolg van een virale infectie (infectie veroorzaakt door een virus). Soms is een bacterie de oorzaak.

Symptomen

Buikpijn is het meest voorkomende symptoom bij deze aandoening. De pijn wordt meestal ervaren in het midden of rechts onderin de buik. Daarom wordt vaak in eerste instantie gedacht aan een appendicitis of blindedarmontsteking.

Andere symptomen van mesenterische adenitis kunnen zijn: koorts, of in sommige gevallen misselijkheid, braken en (bloederige) diarree.

Diagnose

Door het nemen van een echo van de buik kan de diagnose worden gesteld.

Behandeling

De symptomen verdwijnen meestal spontaan na een paar dagen. In tussentijd kan het toedienen van pijnstilling echter nodig zijn. Na twee weken is het meestal volledig opgelost. In uitzonderlijke gevallen kan de buikpijn een viertal weken aanhouden.

Als er wordt vermoed dat een bacterie de oorzaak is, wordt er antibiotica gegeven, maar dit is eerder uitzonderlijk. Je kind kan het ziekenhuis verlaten, indien de pijn onder controle is en hij/zij voldoende kan drinken om uitdroging te voorkomen bij eventueel braken of diarree.

Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan ons contacteren via:

- 03 380 20 90
- Pediatric_azstjozef@emmaus.be
- werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur