

## Contactgegevens

Heb je nog vragen? Stel deze dan gerust aan je behandelende arts of de verpleging van de afdeling.


### Afdeling hart- en longziekten

• 03 380 20 50

Je vindt heel wat praktische en ook financiële informatie op onze website [www.azvoorkempen.be](http://www.azvoorkempen.be)



**AZ Voorkepen**  
algemeen ziekenhuis  
emmaüs



**Huidtesten  
allergie**

Het inademen van stoffen waarop je allergisch reageert, kan klachten van de luchtwegen veroorzaken. Via huidtesten willen we nakijken voor welke stoffen je allergisch bent.

## De voorbereiding

- Bepaalde geneesmiddelen (zeker anti-allergische medicatie) mag je een aantal dagen (vaak meer dan 5) vóór het onderzoek niet innemen. Anders kunnen de resultaten van dit onderzoek worden beïnvloed.
- Verder zijn er geen speciale voorbereidingen.
- Je hoeft niet nuchter te zijn.
- Laat zeker aan je longarts en verpleegkundige weten met welke dieren je vaak in contact komt. Hiervoor kunnen dan specifieke allergietesten worden uitgevoerd.

## Het onderzoek

De stoffen waarop wij je onderzoeken, worden door middel van een druppelteller op verschillende plaatsen op de huid van de beide onderarmen aangebracht. Daarna wordt er met een fijne naald door het bolletje vloeistof in de huid geprikt.

Buiten de stoffen waarop je allergisch kan reageren, is er ook een onschadelijke zoutoplossing als controle. In principe mag je op deze stof niet reageren.

Verder gebruiken we ook een histamineoplossing om de reacties op allergische stoffen te vergelijken met deze van een standaardreactie op histamine.

Na het prikken laten we de allergische stoffen gedurende een 10-tal minuten inwerken. Wanneer je allergisch reageert op een bepaalde stof zal er een lokale zwelling en roodheid ontstaan. Vaak verschijnt er een (wit) bultje alsof je door een mug gestoken bent. De grootte van het bultje komt overeen met de ernst van allergie voor een bepaalde stof.

Het onderzoek neemt in totaal ongeveer twintig minuten in beslag.

## De nazorg

Het eerste uur kan je ter hoogte van beide onderarmen nog een jeukende reactie hebben. Dit zal echter snel verdwijnen. Eventueel kan hiertegen na het onderzoek een antiallergische zalf gestreken worden. Zeldzaam kan er nog een lichte opflakking zijn na 12 uur.