

Injectafer



AZ Voorkempen

algemeen ziekenhuis
emmaüs

Inhoud

1. Voorbereiding.....	4
2. Verloop van de toediening.....	4
3. Nazorg.....	5
4. Mogelijke bijwerkingen.....	5
5. Alternatief.....	6
6. Contactgegevens bij vragen.....	6
7. Persoonlijke notities.....	7

Graag duiden wij je op het belang van een goede informatie voorafgaand aan je Injectafer infuus. Wij raden je dan ook ten zeerste aan deze folder grondig door te nemen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de desbetreffende dienst (zie contactgegevens verder in deze folder).

Je hebt een afspraak gemaakt voor toediening van een Injectafer infuus. Injectafer wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede in geval van ijzertekort, wanneer medicatie via de mond niet werken of niet gebruikt kunnen worden.

Voorafgaand aan de toediening zal je arts een bloedtest doen om de benodigde dosis Injectafer te bepalen. De toediening gebeurt via opname in het daghospitaal. De verpleegkundige zal via een katheter in de hand of arm het Injectafer infuus toedienen.

1. Voorbereiding

Je meldt je op de afgesproken dag en uur aan het geriatrisch daghospitaal (route A 89). Hier worden je administratieve gegevens overlopen en eventueel ook een volgende afspraak gemaakt.

De verpleegkundige maakt ondertussen je infuus klaar.

Voeding

Je hoeft voor de toediening van een Injectafer infuus niet nuchter te zijn. Op het daghospitaal kan je gratis koffie, thee en/of water nemen. Een maaltijd wordt niet voorzien. Je mag echter wel zelf iets meebrengen.

2. Verloop van de toediening

De verpleegkundige kijkt je patiëntenidentificatiearmbandje na, meet de bloeddruk en pols en installeert je voor het plaatsen van de katheter. Het gaat om Injectafer 500 of 1000 mg in 250 cc fysiologische oplossing intraveneus te geven over 60 minuten.

Tip

Meld steeds vooraf of er gekende allergieën / aandachtspunten zijn aan de verpleegkundige.

3. Nazorg

Verloop

Je zult ten minste 30 minuten na elke toediening door je verpleegkundige worden geobserveerd. Vervolgens wordt de infuuskatheter voorzichtig verwijderd en wordt het insteekpunt afgedekt met een kleefpleister. Het is nu belangrijk om het insteekpunt voldoende lang af te drukken om blauwe plekken of ongewenste nabloedingen te voorkomen. Dit minimum drie minuten.

Nacontrole

Je kunt de behandelende arts contacteren via onderstaand nummer. Het resultaat kan je opvragen bij je huisarts.

24 uur na ontslag

Geen bijzondere aandachtspunten.

4. Mogelijke bijwerkingen

Meld onmiddellijk indien je een van volgende tekens of symptomen ervaart die op een ernstige allergische reactie kunnen wijzen: uitslag (bv. netelroos), jeuk, moeilijke ademhaling, piepende ademhaling en/of gezwollen lippen, tong, keel of lichaam.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid en reacties op de injectieplaats

Soms voorkomende bijwerkingen

Gevoelloosheid, tintelend of prikkelend gevoel van de huid, verandering van smaak, hoge hartslag, lage bloeddruk, roodheid in het gezicht, moeilijke ademhaling, braken, indigestie, maagpijn, constipatie, diarree, jeuk,

spierkrampen, koorts, moeheid, pijn in de borst, opgezwollen handen en/of voeten, het koud hebben.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Ontsteking van een ader, rillingen en een algemeen gevoel van ongemak, slap voelen, bleekheid en opgezwollen gezicht.

5. Alternatief

Medicatie per os.

6. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust!

Geriatrisch dagziekenhuis:

- 03 380 21 24
- maandag tot woensdag tussen 10 en 16 uur

Coördinerend verpleegkundige geriatrisch dagziekenhuis:

- Hilde Huygen
- 03 380 21 24

Behandelende arts:

- dr. Laporta Thierry
- 03 380 21 24

Internist-geriater

- 03 380 21 21

Facturatie

- 03 380 26 45

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be.
Je vindt er o.a. meer praktische informatie terug. Ook voor financiële informatie kan je hier terecht.

