

Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan ons contacteren via:

- 03 380 20 90
- Pediatric_azstjozef@emmaus.be
- werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur



AZ Voorkepen
algemeen ziekenhuis
emmaüs



Inhoudsverantwoordelijke: Greet Jacobs - kinderafdeling • VU: Koen Vancraeynest - algemeen directeur • Versiedatum: 12 oktober 2021

Huidtesten

Diagnose van allergie wordt gesteld op grond van:

- de symptomen;
- de ziektegeschiedenis;
- aanvullende onderzoeken: huidtesten en bloedonderzoek.

Voor de huidtesten worden kleine hoeveelheden van het verdachte allergeen (dit is de stof die de allergie veroorzaakt) aangebracht om de reactie te meten.

Vorbereiding

- Je kind moet niet nuchter zijn.
- Het onderzoek zelf zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Breng dus best een leesboekje, fopspeen en/of knuffel van je kind mee.
- Indien je kind thuis medicatie nam, vermeld dit aan de arts vooraleer de huidtesten worden uitgevoerd. Bepaalde geneesmiddelen kunnen de resultaten van het onderzoek beïnvloeden (bv. Zyrtec, Xyzall, Zaditen, Fenistil, Claritine, Alerius, Tinset, Ketotifen, (levo)cetirizine, Atarax, (des)loratidine ...). Je kind mag ze daarom gedurende drie dagen vóór de test niet nemen.
- Smeer 24 uur vóór de test geen cortisonezalf meer. Geef je kind de dag voor de test geen oliebadje of smeer ook geen andere zalf.
- De kinderarts bepaalt welke huidtesten worden uitgevoerd.
 - » baby jonger dan vijf maand: melk, kippenei, huisstofmijt en kat.
 - » kind vijf maand - één jaar: melk, kippenei, appel, vis, pinda, soya, tarwe, huisstofmijt, kat en graspollen.
 - » kind ouder dan één jaar: huisstofmijt, graspollen, voorjaarsbomen, honden, katten, melk en kippenei.

- » huidtesten volledig: huisstofmijt, graspollen, voorjaarsbomen, hond, kat, melk, kippenei, tarwe, appel, pinda, soyaboon, hazelnoot, amandel, vis en schaaldieren.
- Indien je zelf denkt dat je kind voor andere stoffen allergisch is, kan je dit vooraf met de arts bespreken zodat die ook getest kunnen worden.

Verloop

- De test wordt uitgevoerd op de rug of bij grotere kinderen op de arm; T-shirt en hemdje moeten dus uit.
- Op de rug worden nummertjes geschreven afhankelijk van het aantal te onderzoeken allergenen. Dan wordt er een druppel van het te testen allergeen op de huid aangebracht, en met een kleine prik lancet wordt er door de druppel heen in de huid geprikt. Dit zijn vervelende prikjes, maar ze doen niet zo'n pijn (te vergelijken met een muggenprik).
- Baby's blijven gedurende het onderzoek op hun buik liggen (of halfzittende houding bij mama op de schouder).
- Grotere kinderen kunnen rechtop zitten (belangrijk is wel dat ze rustig kunnen zitten en niet met hun handjes aan hun rug komen).
- De huidreacties worden door de verpleegkundige afgelezen na vijftien minuten. De arts zal de resultaten evalueren.
- De test is positief wanneer papel zichtbaar is. Roodheid is minder belangrijk.
- De arts zal de resultaten van de huidtesten en het laboratorium- onderzoek met je bespreken. Indien nodig zullen verdere maatregelen worden getroffen.