

Provocatietest

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt histamine of metacholine gebruikt, een prikkelende stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen kan worden gemeten.

De voorbereiding

Je hoeft niet nuchter te zijn. Voor het goed slagen van de test dien je bepaalde medicatie te stoppen. De behandelende arts zal hieronder aanduiden om welke medicijnen het gaat.

	Te stoppen medicatie	Minimale stoptermijn
	Ventolin	6 uur voor onderzoek
	Atrovent, Combivent, Duovent	12 uur voor onderzoek
	Symbicort, Seretide, Inuvair, Flutiform, Bufomix, Airbufo	3 dagen voor onderzoek
	Oxis, Serevent, Foradil, Onbrez	3 dagen voor onderzoek
	Relvar, Ateectura	3 dagen voor onderzoek
	Spiriva, Spiolto, Incruse, Seebri, Bretaris, Duaklir, Anoro, Ultibro, Trimbrow, Trelegy, Enerzair, Trixeo	≥ 1 week voor onderzoek
	Middelen tegen hoesten	3 dagen voor onderzoek
	Middelen tegen duizeligheid, bv. Betahistine, Betaserc ...	3 dagen voor onderzoek
	Antihistaminicum tabletten, bv. Montelukast, Medrol, Cetirizine, Xyzall, Zyrtec, Bellozal	3 dagen voor onderzoek
	Andere, namelijk	

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit je in een stoel. Je krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat je door de neus ademt. Je ademt via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. Bij het begin van de test zal de laborant vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna inhaleer je met tussenpozen verschillende waterige oplossingen. Na iedere inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kunnen we vaststellen of astmatische klachten (hoesten en/of benauwdheid) kunnen worden uitgelokt. Zoja krijg je onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend waarmee de reactie ongedaan wordt gemaakt.

Tegen het einde van het onderzoek krijg je altijd een luchtwegverwijder. Het onderzoek wordt beëindigd wanneer de longfunctie terug normaal is. Het onderzoek kan 20 minuten in beslag nemen. Een lichte vorm van benauwdheid wordt soms ervaren, die verdwijnt zodra de luchtwegverwijder wordt ingeademd. Na het onderzoek hebben sommige mensen lichte keelpijn of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.



Contactgegevens bij vragen

Heb je na het lezen van deze folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust!
Je kan de raadpleging longziekten contacteren via 03 380 20 50.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be. Je vindt er meer praktische informatie terug over je ziekenhuisfactuur, aanmelden en inschrijven in het ziekenhuis, parkeren ...



AZ Voorkepen
algemeen ziekenhuis
emmaüs