



Toestemmingsformulier voor infiltraties (pijnkliniek)

AZ Voorkepen
algemeen ziekenhuis
emmaüs

www.azvoorkempen.be • azvoorkempen@emmaüs.be
Oude Liersebaan 4 • 2390 Malle • 03 380 20 11

Op vraag van dr. heb je een afspraak voor een behandeling op de pijnkliniek van AZ Voorkepen.

Kan je niet aanwezig zijn op je afspraak?

Annuleer dan minstens 24 uur op voorhand. Bij een latere afmelding zonder geldige reden, zijn we genoodzaakt een administratieve kost van 50,00 euro aan te rekenen.

Wat moet je doen voor de behandeling?

Voor bijkomende informatie en een lijst met mogelijke nevenwerkingen/complicaties dien je onze brochure of website (www.azvoorkempen.be) te raadplegen.

- Je moet niet nuchter zijn.
- Je mag niet zwanger zijn.
- Je meldt je aan op het daghospitaal op de eerste verdieping met de verwijsbrief van de aanvragende geneesheer en dit informatief document, ondertekend door jezelf. Gelieve 20 minuten voor je afspraak aanwezig te zijn.
- Je treft de nodige schikkingen voor begeleiding en vervoer naar huis, omdat je de dag van de behandeling geen voertuig (auto, brommer, fiets ...) mag besturen.
- Gelieve eventuele allergieën vóór de behandeling te melden.
- Indien je bloedverdunnende medicatie inneemt

(TE REGELEN VIA HUISARTS VOOR EVENTUELE SUBSTITUTIE):

- Lage dosis Salicylaten: Acenterine®, Alke Seltzer®, Asaflow®, Aspegic®, Aspirine®, Aspro®, Cardioaspirine®, Cardegic®, Cardiphar®, Dispril®, Sedergine®: te stoppen de dag van de infiltratie.
- Aggrenox®: te stoppen 24 uur voor de infiltratie.
- Xarelto® (Rivaroxaban): te stoppen 48 uur voor de infiltratie
- Eliquis® (Apixaban):
 - indien dosis kleiner of gelijk aan 2.5mg, te stoppen 48 uur voor de infiltratie
 - indien dosis groter dan 2.5mg, te stoppen 72u voor infiltratie
 - ten vroegste 6 uur na infiltratie terug opstarten
- Pradaxa® (Dabigatran): te stoppen 48 uur voor infiltratie, bij slechte nierfunctie 96 uur voordien stoppen (labo met nierfunctie af te spreken met huisarts).
- Arixtra® (Fondaparinux): mag niet toegediend worden in de periode van 48 uur vóór de ingreep, ten vroegste 12 uur nadien terug opstarten.
- Lixiane® (Endoxaban): te stoppen 48 uur vóór de infiltratie.
- Plavix® (Clopidogrel) en Brilique® (Ticagrelor): te stoppen 7 dagen vóór de infiltratie.
- Ticlid® en Efigent® (Prasugrel): te stoppen 10 dagen vóór de infiltratie.
- Marevan®: dient 7 dagen op voorhand gestopt te worden in overleg met de huisarts. Er wordt overgeschakeld op Fraxiparine® of Clexane®. INR-controle vlak voor punctie (INR < 1,3).
- Marcoumar®: dient 10 dagen op voorhand gestopt te worden in overleg met de huisarts. Er wordt overgeschakeld op Fraxiparine® of Clexane®. INR-controle vlak voor punctie (INR < 1,3).
- Sintrom®: 4 dagen op voorhand stoppen in overleg met de huisarts. Er wordt overgeschakeld op Fraxiparine® of Clexane®. INR-controle vlak voor punctie (INR < 1,3).

- Fraxiparine®, Clexane®:
 - o Profylactische dosis: mag niet worden toegediend in de periode van 12 uur vóór de ingreep tot 12 uur erna.
 - o Therapeutische dosis: mag niet worden toegediend in de periode van 24 uur vóór de ingreep. Herstart na 12 uur, eerste dosis profylactisch. Volgende dag therapeutische dosis.
- Fraxodi®: mag niet toegediend worden in de periode van 24 uur vóór de ingreep. Herstart na 12 uur, eerste dosis profylactisch. Volgende dag therapeutische dosis.

Indien je allergisch bent voor bepaalde producten, gelieve dit te melden aan de verpleging vóór de infiltratie. **Bij het niet tijdig stoppen van bloedverduuners kan je infiltratie niet plaatsvinden.**

Hoe verloopt de behandeling?

Onder röntgenstralen krijg je een inspuiting. Er wordt een lokaal verdovingsmiddel en/of een corticoïd ingespoten. Je dient een goed ontspannen houding aan te nemen. Deze pijn bestrijdende behandeling wordt eventueel herhaald. De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Wat na de behandeling?

- Na de infiltratie dien je een tijdje bij ons te blijven ter observatie alvorens je het ziekenhuis mag verlaten.
- Na een cervicale procedure of indien uw behandelend arts dit nodig acht, verblijft u gedurende enige tijd in de ontwaakzaal voor observatie.
Om uw veiligheid en een optimale opvolging te garanderen, is deze ruimte uitgerust met camerabewaking.
- Na de behandeling mag je in géén geval zelf een voertuig besturen.
- Probeer het rustig aan te doen de dag van behandeling en niet te gaan werken. Wees voorzichtig met het nemen van trappen.
- Een technisch correct uitgevoerde infiltratie kan, zoals elke behandeling, enkele nevenwerkingen (deze lijst is niet als volledig te beschouwen) hebben, waaronder:
 - een kleine kans op bloeding, infectie, zenuwbeschadiging en pijn door de prik zelf;
 - bloeddrukdaling;
 - meer uitgebreide of verlengde werking van de lokale verdoving;
 - een licht gevoel van gejaagdheid, een blos op de wangen of een lichte gewichtstoename, komen sporadisch voor door de medicatie;
 - onvoorzien binnendringen van de punt van de naald in het ruggenmergvocht, wat nadien soms hoofdpijn kan veroorzaken;
 - stijging van de suikerspiegel na toedienen van corticoïd.

BELANGRIJK

Sinds november 2016 worden er slechts drie inspuitingen van hetzelfde type, per 12 maanden, terugbetaald door het RIZIV. Ik verklaar dat ik hiervan op de hoogte ben en indien blijkt dat dit aantal overschreden is, weet ik dat ik een niet-terugbetaald bedrag van 231,74 euro, exclusief medicatiekosten, zal betalen.

Gelezen en akkoord op datum:

Naam patiënt:

Handtekening: